原子吸收法测定牛奶中的乳酸

马鸿飞 王伟 孙为德

(盐城工学院化学工程系,盐城,224003)

摘要 研究了原子吸收法测定牛奶中的游离乳酸。在弱碱性溶液中乳酸与 $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$ 悬浮液作用,置换出 $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$ 中的 Cu,形成更稳定的乳酸铜,离心沉降未反应的 $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$,用原子吸收法测定上层清液里乳酸铜中的铜,根据铜能与乳酸定量形成配合物,可间接求得乳酸的含量。对牛奶样品中乳酸的测定结果相对标准偏差小于 1.4%,回收率在 95%~98%之间。

关键词 原子吸收法 乳酸 $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$ 悬浮液

分类号 TS201

引言

乳酸,学名为 2-羟基丙酸。在使用发酵方法生产的食品以及添加防腐剂、酸味剂的食品中,由于乳酸菌的作用,均含有一定量的乳酸。食品中乳酸含量的高低对其质量及风味具有相当大的影响,因此,食品中乳酸含量的测定就具有了实际意义。目前,乳酸的测定方法有气相色谱法、高效液相色谱法、分光光度法和酶电极法等。原子吸收法与上述方法比较,简便快速、结果可靠、检出限低。本法使用 $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$ 悬浮液同乳酸作用,乳酸同 $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$ 中的 Cu 配合,释放出 PO_4^{3-} ,然后离心沉降未反应的 $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$,用原子吸收法测定溶液中的 Cu,可间接测定乳酸。

1 实验部分

1.1 主要仪器及测定条件

原子吸收分光光度计(3200型) 上海分析仪器厂

铜空心阴极灯 上海分析仪器厂

离心沉淀器(800型) 上海手术器械十厂

本实验使用 3200 型原子吸收分光光度计,其工作条件如表 1 所示(其它型号的仪器另行选择)。

表 1 测定铜的仪器条件

	灯电流 mA	波长 nm	狭缝宽度 mm	乙炔流量 L/min	空气流量 L/min	标尺扩展
铜	8	324.7	0.2	0.9	5.0	×2

1.2 标准溶液的配制

铜标准溶液($1.000\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$) 准确称取 1.000g 高纯铜粉于 100mL 小烧杯中,用 1:1 硝酸加热溶解,再加 10mL 高氯酸加热至冒白烟,除去 HNO_3 ,冷却后置于 1000mL 容量瓶中,定

容, 摇匀。以此标液逐级稀释为所需工作液。

$\text{NH}_3\text{-NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液 $\text{pH}=9.0$ CuCl_2 水溶液 3%

Na_3PO_4 水溶液 7% $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ 水溶液 2%

$\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$ 悬浮液 取 4mL Na_3PO_4 (7%) 溶液边搅拌边加入 3% 的 CuCl_2 溶液 2mL, 摇匀后, 在 4000 rpm 的转速下离心分离, 用倾泻法倾去上层清液, 用 6mL $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ (2%) 溶液洗涤沉淀两次, 加 0.3 克固体 NaCl , 用 $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ (2%) 溶液将沉淀稀释至 100mL, 使用时摇匀。

乳酸标准溶液 100.00 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 由分析纯试剂制配而成, 并以国标 (GB2302-80) 方法进行测定。

所用水均为去离子水。

1.3 实验方法

准确移取 1.0mL 的试样于校正过的离心试管中, 加入 1mL $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$ 悬浮液, 摇匀, 加入 2mL 氨性缓冲溶液, 放置一昼夜, 用水稀释至 6.00mL, 再摇匀, 在 4000rpm 的转速下离心分离 1min, 将离心后的上层清液移至 25mL 容量瓶中, 用少量水与 2mL 氨性缓冲溶液洗涤沉淀后离心, 洗涤后的清液也转移至容量瓶中, 如此反复洗涤三次。用水稀释至刻度。同时按上述方法做空白试验作参比, 以表 1 所示的工作条件用原子吸收法测定定容后的上层清液中的 Cu , 得出吸光度。另取标准溶液制作标准曲线, 在标准曲线上求出乳酸的含量。

2 结果与讨论

2.1 酸度的影响

用不同 pH 值的缓冲溶液对同一浓度的乳酸标准溶液进行试验, 结果表明, pH 大于 7 的溶液中, 乳酸与 $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$ 定量发生配位反应, 而在 pH 小于 7 的溶液中, $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$ 则会溶解, 无法进行定量测定, 因此, 本方法采用 $\text{pH}=9$ 的缓冲介质。

2.2 共存离子的干扰及抑制

对牛奶中可能存在的钾、钙、镁、铁等金属元素做了干扰试验, 实验证明, 这些共存元素均对测定无影响, 如表 2 所示。

此外, 50 μg 以下的草酸、蔗糖, 25 μg 以下的维生素 C, 10 μg 的酒石酸对测定均无干扰, 5 μg 以上的氨基酸对测定有干扰, 可加入亚硝酸钠, 加热使其分解而消除干扰。

2.3 放置时间的影响

准确称取 1.0mL 乳酸溶液与 1mL 磷酸铜悬浊液于离心管中, 调节 pH 值为 9, 分别放置不同时间, 离心并洗涤后以表 1 的工作条件测定上层清液的吸光度。结果表明, 放置时间为 10h 以上, 可得到稳定的结果。

2.4 标准曲线的绘制

准确吸取乳酸标准溶液 (100 $\mu\text{g}/\text{mL}$) 0.20、0.40、0.60、0.80、1.00mL, 分别置于校正过的 6mL 离心管中, 按 1.3 方法操作, 得到标准曲线如图 1。

图 1 乳酸标准溶液的工作曲线

2.5 试样分析

取市售瓶装牛奶 1 瓶,充分混匀,移取 10mL 至 100mL

容量瓶中定容,立即取此溶液 1.00mL,于校正过的 6mL 离心管中,按 1.2 方法操作,测定吸光度,从标准曲线上求出牛奶中乳酸的含量,结果比较如表 3 所示。

2.6 标准回收率试验

在样品中准确加入 100.0 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 的乳酸标准溶液 0.5mL,按 1.2 方法测定吸光度,求算乳酸的含量,计算回收率,如表 4 所示,结果表明,标准回收率在 95~98% 之间。

表 2 共存元素的干扰试验

共存元素	钾	钙	镁	铁	锌	铝
干扰量 $\mu\text{g}/\text{mL}$	>100	>20	>20	>20	>15	>10

表 3 样品分析结果

	I	II	III	IV	V
本法测定结果 $\mu\text{g}/\text{mL}$	850	869	843	865	854
平均值 $\mu\text{g}/\text{mL}$	856				
相对标准偏差 %	1.4				

表 4 回收率的测定

	I	II	III	IV	V
样品含量 μg	42.3	53.0	37.0	34.3	54.1
标准加入量 μg	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
测得量 μg	89.9	101.1	86.0	82.2	102.2
回收率 %	95.2	96.2	98.0	95.8	96.2

参考文献

- 1 胡家元. 分析测试通报. 1992 11(5) 88~90
- 2 Figenschou D. L.; Marais J. P. Anal. Biochem. 1991 195(2) 308~302
- 3 任一平等. 食品与发酵工业. 1991(5) 41~44
- 4 Palleschi G.; Turner A. P. F. Anal. Chim. Acta. 1990. 234(2) 459~463
- 5 黄卓辉等. 新疆大学学报. 1990. 7(3) 67~70

(上接第 44 页)

参考文献

- 1 V. V. Ilyukhin, N. N. Nersky, M. G. Bickbay, Crystal Structure of Alinifg, Nature, 269(1997), P397~398
- 2 F. V. Lampe etc, Synthesis, structure and Thermal Decomposition of Alinite, Cem, Concr, Res, 1986, Vol. 16, P505~510
- 3 F. V. Lampe. Silikattechnik 6. 194. 1988
- 4 J. Neubauer and H. Pollman, Alinite—Chemical Composition. Solid Solution and Hyolration Beomide Alinite, Cem. Concr. Res, Vol, 24, 1944. P1413~1422
- 5 W. Kurdowski. Bromide Alinite, Cem. Concr. Res, Vol. 17, 1987. P361~367
- 6 A. I. Botkova, etc, Hydration Aelivity of Chlorine—Containing Pheses, Sth, Znt, Congr, Chem. Vol. 2. 1, 1986, P127~276
- 7 F. W. Locher. Low Energy Cliniker Formation, 8th, int, Congr, Chem, Cem (Brasil), Aiinite, Cem, Concr, Res, Vol. 17, 1987. P361~364
- 8 王祝然. 阿利尼特及混凝土. 水泥. 22. 9. 1989
- 9 陈明源等. 氯化钙的矿化作用及其机理, 第四届水泥学术会议论文集. 中国建材工业出版社. 1992. P64~67